

第三次习题课

考试要点及例题讲解

集合的基本操作及性质

- 下列关于集合的说法不正确的是
- A. 存在 $H = \{x \mid x \text{ 是一个集合} \wedge x \in x\}$
- B. $\emptyset \in \emptyset$.
- C. $\{a, b\} \subseteq \{a, b, c, \{\{a, b\}\}\}$.
- D. 若 $A \in B$ 且 $B \subseteq C$, 则 $A \subseteq C$.

ABD

可用反证法证明集合 H 是不存在的. 假设存在这样的集合 H . 下面将证明, 对某一具体事物 y , 无法确定 y 是否属于 H . 我们以 H 本身作为这个具体事物 y , 证明中 y 就是 H . 对于集合 H , 必有 $y \in H$ 或 $y \notin H$, 下面分别考虑之. (1) 若 $y \in H$. 由于 y 是 H 的元素, y 就具有 H 中元素的性质 $y \notin y$. 考虑到 y 就是 H , 所以 $y \notin H$. 这与 $y \in H$ 矛盾. (2) 由于 y 不是 H 的元素, y 就没有 H 中元素的性质, 因此 $y \in y$. 又因 y 就是 H , 则 $y \in H$. 这与 $y \notin H$ 矛盾. 两种情况都存在矛盾, 所以 $y \in H$ 和 $y \notin H$ 都不成立, 集合 H 不存在. 问题的根源在于, 集合论不能研究“所有集合组成的集合”. 这是集合论中的一个悖论, 称为 Russell 悖论.

幂集和广义集合

- 写出 $\{\{a\}, a\}$ 的幂集.

$$P(A) = \{\emptyset, \{a\}, \{\{a\}\}, \{\{a\}, a\}\}$$

- 写出 $\{\{1, \{2\}\}\}$ 的幂集.

$$P(A) = \{\emptyset, \{\{1, \{2\}\}\}\}$$


- 写出 $\cap\{\{1, 2, 3\}, \{2, 3, 4\}, \{3, 4, 5\}\}$.

$$\cap\{\{1, 2, 3\}, \{2, 3, 4\}, \{3, 4, 5\}\} = \{3\}$$


集合的图像表示

- 画出下列集合的文氏图

$$A \cap (\neg B \cup \neg C).$$



$$A \oplus (B \cup C).$$



关系及关系矩阵

设 $A = \{1, 2, 3\}$, 在 A 上有多少不同的关系? 设 $|A| = n$, 在 A 上有多少不同的关系?


$A = \{1, 2, 3\}$ 时, A 上不同的关系有 $2^{3^2} = 512$ 种.

$|A| = n$ 时, A 上不同的关系有 2^{n^2} 种.

对 $A = \{0, 1, 2, 3, 4\}$ 上的下列关系, 给出关系图和关系矩阵.

$R_1 = \{\langle x, y \rangle \mid x < y \text{ 或 } x \text{ 是质数}\}$

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$



关系的逆、合成

设集合 A 上的关系 R 为

$$A = \{a, \{a\}, \{\{a\}\}\},$$

$$R = \{\langle a, \{a\} \rangle, \langle \{a\}, \{\{a\}\} \rangle\}.$$

求 R^{-1} $R \upharpoonright \{\{a\}\}$ $R \circ R$ $R[\{a\}]$

$$R^{-1} = \{\langle \{a\}, a \rangle, \langle \{\{a\}\}, \{a\} \rangle\}$$

$$R \upharpoonright \{\{a\}\} = \{\langle \{a\}, \{\{a\}\} \rangle\}$$

$$R \circ R = \{\langle a, \{\{a\}\} \rangle\}$$

$$R[\{a\}] = \{\{a\}\}$$

对 X 到 Y 的关系 Q , Y 到 Z 的关系 S ,
 Z 到 W 的关系 R .

下列说法中正确的是

- A. $(S \circ R)^{-1} = R^{-1} \circ S^{-1}$.
- B. $\text{ran}(R^{-1}) = \text{dom}(R)$
- C. $(R \circ S) \circ Q = R \circ (S \circ Q)$
- D. $S \circ R \neq R \circ S$.

ABCD

等价、相容、偏序、拟序

- 等价：自反+对称+传递
- 相容：自反+对称
- 偏序：自反+反对称+传递
- 拟序：非自反+反对称+传递

R 是 A 上自反的 $\Leftrightarrow (\forall x)(x \in A \rightarrow xRx)$,

R 是 A 上非自反的 $\Leftrightarrow (\forall x)(x \in A \rightarrow x \not R x)$.

R 是 A 上对称的 $\Leftrightarrow (\forall x)(\forall y)$

$$((x \in A \wedge y \in A \wedge xRy) \rightarrow yRx)$$

R 是 A 上反对称的 $\Leftrightarrow (\forall x)(\forall y)$

$$((x \in A \wedge y \in A \wedge xRy \wedge yRx) \rightarrow x = y)$$

R 是 A 上传递的 $\Leftrightarrow (\forall x)(\forall y)(\forall z)$

$$((x \in A \wedge y \in A \wedge z \in A \wedge xRy \wedge yRz) \rightarrow xRz).$$

函数的概念及性质

- 下列说法中正确的是
- A. $\{\langle x, y \rangle \mid x \in \mathbf{N} \wedge y \in \mathbf{N} \wedge x + y < 10\}$ 是函数
- B. $f: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}, f(x) = x^2 - 2x - 15$ 是单射的
- C. $f: \mathbf{R} \rightarrow (0, \infty), f(x) = 2^x$ 是双射的
- D. $f: \mathbf{Z} \rightarrow \mathbf{N}, f(x) = |x|$ 是满射的

CD

(1) 若 $\text{ran}(f) = B$, 则称 f 是满射的, 或称 f 是 A 到 B 上的;

(2) 若对任意的 $x_1, x_2 \in A, x_1 \neq x_2$, 都有

$f(x_1) \neq f(x_2)$, 则称 f 是单射的, 或内射的, 或一对一的;

(3) 若 f 是满射的又是单射的, 则称 f 是双射的, 或一对一 A 到 B 上的. 简称双射.

函数的复合及逆

设 $f, g, h \in \mathbf{N}_\mathbf{N}$, $f(n) = n + 1$, $g(n) = 2n$, $h(n) = \begin{cases} 0 & n \text{ 是偶数} \\ 1 & n \text{ 是奇数} \end{cases}$, 求出 $f \circ f, f \circ g, g \circ f, g \circ h, h \circ g, (f \circ g) \circ h$.

$$f \circ f(n) = n + 2, f \circ g(n) = 2n + 1, g \circ f(n) = 2n + 2,$$

$$g \circ h(n) = \begin{cases} 1 & n \text{ 为偶数} \\ 1 & n \text{ 为奇数} \end{cases}, h \circ g(n) = 0, (f \circ g) \circ h(n) = \begin{cases} 1 & n \text{ 为偶数} \\ 3 & n \text{ 为奇数} \end{cases}$$

定义 11.2.2 设 $f: A \rightarrow B, g: B \rightarrow A$, 如果 $g \circ f = I_A$, 则称 g 为 f 的左逆; 如果 $f \circ g = I_B$, 则称 g 为 f 的右逆.

补充题讲解

9.1. 集合的概念和表示方法

- () 1. 以下__不是集合
- A. $\phi \times P(\phi)$ (P 表示幂集运算)
 - B. $\{x | x \text{ 是整数且 } |x| \text{ 是素数}\}$
 - C. $\{x | x \text{ 是包含 } 1 \text{ 的集合}\}$
 - D. $\{x | x \text{ 包含 } 1 \text{ 且 } x \subseteq R\}$

C

书P131

矛盾. 两种情况都存在矛盾, 所以 $y \in H$ 和 $y \notin H$ 都不成立, 集合 H 不存在. 问题的根源在于, 集合论不能研究“所有集合组成的集合”. 这是集合论中的一个悖论, 称为 Russell 悖论.

9.3. 集合的运算

() 10. 以下各项中正确的选项为_____。

A. $\emptyset \cup \{\emptyset\} = \emptyset$

B. $\{\emptyset, \{\emptyset\}\} - \{\{\emptyset\}\} = \{\emptyset\}$

C. $\{\emptyset, \{\emptyset\}\} - \{\emptyset\} = \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$

D. $\{\emptyset, \{\emptyset\}\} - \emptyset = \{\{\emptyset\}\}$

B


大括号层级分清楚

9.4. 集合的图形表示法

10. 对 24 名科技人员进行掌握外语情况的调查，其统计资料如下：会说英语、日语、德语、法语的人数分别是 13、5、10 和 9。其中同时会说英语、日语的人数为 2。同时会说英语、德语或同时会说英语、法语或同时会说德语、法语两种语言的人数均为 4。会说日语的人既不会说法语也不会说德语。则同时会说英语、德语、法语的人数为 1。

$$\sum 1\text{个} - \sum 2\text{交} + \sum 3\text{交} - 4\text{交} = 4\text{并}$$
$$(37) - (14) + (x) = 24 \Rightarrow x = 1$$



9.4. 集合的图形表示法



9.5. 集合运算的性质和证明

- () 2. $A \cup (B \cap C)$ 与 ___ 不恒等
- A. $(A \cup B) \cap (A \cup C)$
 - B. $((A - B) - C) \cup (B \cap C)$
 - C. $(A - B) \cup (B \cap C) \cup (A - C)$
 - D. $A \cup (B - (B \oplus C))$

B



9.5. 集合运算的性质和证明

书P142及145

() 3. 假设 $A \subseteq B$, 以下___不一定成立

A. $\cup A \subseteq \cup B$

B. $\cap A \subseteq \cap B$

C. $P(A) \subseteq P(B)$

D. $A - B \subseteq B - A$

B

定理 9.5.11 对集合的集合 A 和 B , 有

(1) $A \subseteq B \Rightarrow \cup A \subseteq \cup B$,

(2) $A \subseteq B \Rightarrow \cap B \subseteq \cap A$, 其中 A 和 B 非空.

证明 (1) 设 $A \subseteq B$. 对任意的 x , 可得

$$\begin{aligned} x \in \cup A &\Leftrightarrow (\exists y)(x \in y \wedge y \in A) \\ &\Rightarrow (\exists y)(x \in y \wedge y \in B) \Leftrightarrow x \in \cup B \end{aligned}$$

所以, $\cup A \subseteq \cup B$.

(2) 设 $A \subseteq B$. 对任意的 x , 可得

$$\begin{aligned} x \in \cap B &\Leftrightarrow (\forall y)(y \in B \rightarrow x \in y) \\ &\Rightarrow (\forall y)(y \in A \rightarrow x \in y) \text{ (由 } A \subseteq B) \\ &\Leftrightarrow x \in \cap A \end{aligned}$$

所以, $\cap B \subseteq \cap A$.

9.6. 有限集合的基数

1. 对于有限集合 A 、 B ， $P(P(A) \times B)$ 基数是 $2^{|B|} * 2^{|A|}$

$P(A)$ 基数是 $2^{|A|}$

9.7. 集合论公理系统

三. (8') 证明: $A \times A \in P(P(P(A)))$.

9.7 证明: (根据定义证明)

$$A \times A = \{ \langle x, y \rangle \mid x, y \in A \} = \{ \{x, y\}, \{x\} \mid x, y \in A \}.$$

$$\{x\} \in P(A), \{x, y\} \in P(A)$$

$$\Rightarrow \{ \{x\}, \{x, y\} \} \subseteq P(A)$$

$$\Rightarrow \langle x, y \rangle \subseteq P(A)$$

$$\Rightarrow \langle x, y \rangle \in PP(A)$$

$$\Rightarrow A \times A \subseteq PP(A)$$

$$\Rightarrow A \times A \in PPP(A).$$

10.1. 二元关系

2. 设 A 是 n 个元素的集合, 则 A 中的所有不同关系的总数是 2^{n^2}

$A \times A$ 有 n^2 种组合

每个组合有两种可能 (xRy 或 $x \not R y$)

10.5. 关系的闭包

五. (8') 给定 $A = \{1, 2, 3, 4\}$ 和 A 上的关系 $R = \{\langle 1, 3 \rangle, \langle 1, 4 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 2, 4 \rangle, \langle 3, 4 \rangle\}$.

求: R 的自反闭包、对称闭包及传递闭包的关系矩阵.

五. $A = \{1, 2, 3, 4\}$

$$R = \{\langle 1, 3 \rangle, \langle 1, 4 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 2, 4 \rangle, \langle 3, 4 \rangle\}$$

$$M(R) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$I(R) = R \cup R^0 = R \cup I_A$$

$$M(I(R)) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$s(R) = R \cup R^{-1}$$

$$M(s(R)) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

R 本身是传递的, $M(t(R)) = M(R)$.

10.5. 关系的闭包

八. (10') 设 $A = \{a, b, c, d\}$ 中的关系 $R = \{\langle a, b \rangle, \langle b, a \rangle, \langle b, c \rangle, \langle c, d \rangle\}$,

(1) 用 $M(R)$ 的幂求 R^2, R^3 ;

(2) 求最小的自然数 m, n ($m < n$), 使得 $R^m = R^n$.

(3) 求出关系 R 的自反、对称且传递的闭包, 请写出详细步骤。

八. (1) $A = \{a, b, c, d\}$,

$$M(R) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$M(R^2) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$R^2 = \{\langle a, a \rangle, \langle a, c \rangle, \langle b, b \rangle, \langle b, d \rangle\}$$

10.5. 关系的闭包

$$M(R^3) = M(R^2 \circ R)$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$R^3 = \{ \langle a, b \rangle, \langle a, d \rangle, \langle b, a \rangle, \langle b, c \rangle \}.$$

$$(2) \quad M(R^4) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$R^2 = R^4 \Rightarrow m=2, n=4.$$

$$(3) \quad \text{自反} \quad r(R) = R \cup I_A = \{ \langle a, b \rangle, \langle b, a \rangle, \langle b, c \rangle, \langle c, d \rangle \\ \langle a, a \rangle, \langle b, b \rangle, \langle c, c \rangle, \langle d, d \rangle \}.$$

$$\text{对称} \quad s(R) = R \cup R^{-1} = \{ \langle a, b \rangle, \langle b, a \rangle, \langle b, c \rangle, \langle c, d \rangle, \\ \langle c, b \rangle, \langle d, c \rangle \}.$$

$$\text{传递} \quad t(R) = R \cup R^2 \cup R^3 \dots$$

$$M(t(R)) = M(R \cup R^2 \cup R^3) = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$t(R) = \{ \langle a, b \rangle, \langle a, c \rangle, \langle a, d \rangle, \langle a, a \rangle \\ \langle b, a \rangle, \langle b, b \rangle, \langle b, c \rangle, \langle b, d \rangle \\ \langle c, d \rangle \}.$$

10.6. 等价关系和划分

15

3. $A = \{1, 2, 3, 4\}$ 上的等价关系的个数为

书上P181

定理 10.6.1 R 是非空集合 A 上的等价关系, 对任意的 $x, y \in A$, 成立

- (1) $[x]_R \neq \emptyset$ 且 $[x]_R \subseteq A$,
- (2) 若 xRy , 则 $[x]_R = [y]_R$,
- (3) 若 $x \not R y$, 则 $[x]_R \cap [y]_R = \emptyset$,
- (4) $\cup \{[x]_R \mid x \in A\} = A$.

10.6. 等价关系和划分

四. (8') 设 R 是 A 中的对称关系, 且 $R^2 \subseteq R$, 证明: $S = I_A \cup R$ 是 A 上的等价关系。

先证明自反性

$$\langle x, x \rangle \in I_A \Rightarrow \langle x, x \rangle \in I_A \cup R \Rightarrow x S x \text{ 得证.}$$

再证明对称性

$$x S y \Leftrightarrow x R y \vee x I_A y \Leftrightarrow y R x \vee y I_A x \Leftrightarrow y S x$$

最后是传递

$$(x S y) \wedge (y S z)$$

$$\Leftrightarrow (x I_A y \vee x R y) \wedge (y I_A z \vee y R z)$$

$$\Leftrightarrow (x I_A y \wedge y I_A z) \vee (x I_A y \wedge y R z)$$

$$\vee (x R y \wedge y I_A z) \vee (x R y \wedge y R z)$$

$$\Leftrightarrow (x I_A z) \vee (x R z) \vee (x R z) \vee (x R^2 z)$$

$$\Rightarrow x S z.$$

10.8. 偏序关系

- () 6. 下面四个关系中_____是拟序关系
- A. R 中的 “ $>$ ” 关系
 - B. $N - \{0\}$ 中的整除关系
 - C. $N - \{0\}$ 中的互素关系
 - D. $R = \{ \langle x, y \rangle \mid (x - y) \text{ 被 } 5 \text{ 整除}, x, y \in Z \}$

A

书上P185

定义 10.8.2 对非空集合 A 上的关系 R , 如果 R 是非自反的和传递的, 则称 R 为 A 上的拟序关系.

定理 10.8.1 R 为 A 上的拟序关系, 则 R 是反对称的.

10.6-8. 等价关系和划分、相容关系和覆盖、偏序关系

()7. 设 R 是 A 中的一个关系, $I_A \subseteq R$, 若有 $\langle a, b \rangle \in R \wedge \langle a, c \rangle \in R \Rightarrow \langle b, c \rangle \in R$, 则下列说法最准确的是_____

- A. R 是等价关系
- B. R 是相容关系
- C. R 是偏序关系
- D. R 是拟序关系

A

(自反+对称) +传递

10.6-8. 等价关系和划分、相容关系和覆盖、偏序关系

() 11. R_1, R_2 均为 A 中的关系, 下面结论正确的是_____。

- A. 若 R_1, R_2 均为对称关系, 则 $R_1 \circ R_2$ 为对称关系
- B. 若 R_1 是偏序关系, 则 R_1^{-1} 也是偏序关系
- C. $t(R_1) \cup t(R_2) = t(R_1 \cup R_2)$
- D. $st(R_1) = ts(R_1)$

B

$$r_1 = \{\langle 1,2 \rangle, \langle 2,1 \rangle\}$$

$$r_2 = \{\langle 2,3 \rangle, \langle 3,2 \rangle\}$$

$$r_1 \circ r_2 = \{\langle 1,3 \rangle\}$$

定理 10.5.6 对非空集合 A 上的关系 R_1, R_2 , 则

$$(1) r(R_1) \cup r(R_2) = r(R_1 \cup R_2),$$

$$(2) s(R_1) \cup s(R_2) = s(R_1 \cup R_2),$$

$$(3) t(R_1) \cup t(R_2) \subseteq t(R_1 \cup R_2).$$

定理 10.5.12 对非空集合 A 上的关系 R , 有

$$(1) rs(R) = sr(R),$$

$$(2) rt(R) = tr(R),$$

$$(3) st(R) \subseteq ts(R).$$

其中 $rs(R) = r(s(R))$, 其他类似。

书上P166及P174

10.6-8. 等价关系和划分、相容关系和覆盖、偏序关系

() 15. 设 R 是 A 中的对称关系, 且 $R^2 \subseteq R$, 则 $S = I_A \cup R$ 是 A 上_____。

- A. 相容关系
- B. 等价关系
- C. 偏序关系
- D. 拟序关系

B

对称+ (自反+传递)

11.1. 函数和选择公理

4. $A = \{a, b\}$, $B = \{1, 2, 3\}$. 从 A 到 B 的满射函数有 0 个。

书上P195


如果 $f: A \rightarrow B$ 是满射的, 则对任意的 $y \in B$, 存在 $x \in A$, 使 $f(x) = y$. 如果 $f: A \rightarrow B$ 是单射的, 则对任意的 $y \in \text{ran}(f)$, 存在唯一的 $x \in A$, 使 $f(x) = y$.

11.1. 函数和选择公理

() 13. 函数 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^3 - x^2 + x$ 是_____。

- A. 满射但是不单射的
- B. 单射但是不满射的
- C. 双射的
- D. 既不是满射也不是单射的

C



11.2. 函数的合成与函数的逆

() 9. f, g 是函数. 若 g 不是单射的, 则_____

A. $f \circ g$ 不是单射的

B. $g \circ f$ 不是单射的

C. A, B 都不对

D. 不一定

A

书上P197

定理 11.2.1 设 $g:A \rightarrow B, f:B \rightarrow C$, 则

(1) $f \circ g$ 是函数 $f \circ g:A \rightarrow C$,

(2) 对任意的 $x \in A$, 有 $(f \circ g)(x) = f(g(x))$.

11.2. 函数的合成与函数的逆

() 8. f 是集合 A 到集合 B 的关系, 则_____

A. 若 f 是函数, 则 f^{-1} 也是函数

B. 若 f^{-1} 是函数, 则 f 也是函数

C. 若 f 不是函数, 则 f^{-1} 也不是函数

D. 都不对

D

多对一 vs. 一对多

11.2. 函数的合成与函数的逆

() 14. 函数 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x + 1$ 与 $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, g(y) = y - 1$, 则函数的合成 $h = f \circ g$ 为_____。

A. $h(x) = x$

A

B. $h(x) = x^2 - 1$

C. $h(x, y) = (x + 1)(y - 1)$

D. $h(x) = x^2 + x - 1$

$$h(x) = (x - 1) + 1$$

11.2. 函数的合成与函数的逆

等于

8. 若函数 $f: A \rightarrow B$ 是双射的, 则 f 的左逆_____右逆 (等于, 不等于)。

书上P200

定理 11.2.8 设 $f: A \rightarrow B, A \neq \emptyset$, 则

- (1) f 存在左逆, 当且仅当 f 是单射的;
- (2) f 存在右逆, 当且仅当 f 是满射的;
- (3) f 存在左逆又存在右逆, 当且仅当 f 是双射的;
- (4) 若 f 是双射的, 则 f 的左逆等于右逆.

(4) 设 f 的左逆为 $g: B \rightarrow A$, 右逆为 $h: B \rightarrow A$, 则 $g \circ f = I_A, f \circ h = I_B$.

$$g = g \circ I_B = g \circ (f \circ h) = (g \circ f) \circ h = I_A \circ h = h$$

所以, $g = h$.

11.3. 函数的性质

五. (8') 设 $f: A \rightarrow B, g: C \rightarrow D, f \subseteq g, C \subseteq A$, 证明 $f = g$

$\forall \langle x, y \rangle \in g$, 有 $x \in C$, 由 $C \subseteq A$, 则 $x \in A$,

那么 $\exists y_0, f(x) = y_0$, 即 $\langle x, y_0 \rangle \in f$,

又由 $f \subseteq g$, 则 $\langle x, y_0 \rangle \in g$.

由函数定义易知 $y = y_0$, 因此 $\langle x, y \rangle \in f$

则 $g \subseteq f$, 所以 $f = g$.